

#止めるぞ_風しん

対象:1962(昭和37)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれの男性の皆様

・無料抗体検査クーポンが届きましたら、健康診断の機会などで、**抗体検査**をお願いします



あなたが
風しんに



あなたが
苦しい
だけでなく



風しん
拡散



妊婦さん
感染



赤ちゃんが
障がいをもって
生まれる可能性が
あります

One for all,

ひとはみんなのために、
みんなはひとりのために

all for one

トライなんてさせない
タックルで止める

感染なんてさせない
ワクチンで止める

ラグビー日本代表 ©JRFU



厚生労働省

Ministry of Health, Labour and Welfare

風しん 厚生労働省





あなたが風しんの感染を拡大させてしまう 可能性があります



お手元に届くクーポン券※により、健康診断の機会や
お近くの医療機関で抗体検査を受けましょう。



風しんへの抵抗力が無いこと(抗体なし)がわかった場合、
予防接種を受けましょう。

対象者は風しんの抗体検査及び予防接種が原則無料※となります。

2019年度は、1972(昭和47)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれの男性に市区町村がクーポン券を送付します。
なお、2019年度にクーポン券が送付されない・届いていない対象者も市区町村に希望すればクーポン券を発行し、抗体検査を受けられます。※
子どもの頃に風しんに感染したかどうか記憶が曖昧な場合も抗体検査を受けましょう。

Q:なぜ風しんへの 抵抗力が必要なのか?

A・成人は小児に比べて
症状が重くなること
があります。



Q:風しんに感染すると 何が問題なのか?

A・電車や職場など人が集まる場所で、
多くの人に感染させる可能性があります。
・妊娠早期の妊婦に風しんを感染させると、
赤ちゃんが先天性風しん症候群になる可能性があります。



抗体検査

職場での健康診断や近隣の
病院・診療所で受けられます。※
クーポン券を使えば抗体検査は無料となります。

抗体あり

・風しんへの抵抗力があります。

抗体なし

・風しんへの抵抗力がありません。
・風しんにかかるリスクがあります。

予防接種を受けましょう
原則無料となります。※

風しんとは

感染者の咳やくしゃみ、会話などで飛び散るしぶき(飛沫)を吸い込んで感染します。
小児は発熱、発疹、首や耳の後ろのリンパ節が腫れて、数日で治ります。まれに、高熱
や脳炎になって入院することがあります。
成人は高熱・発疹の長期化や関節痛など重症化の可能性があります。

先天性風しん症候群とは

妊娠初期(20週以前)に風しんに感染すると、赤ちゃんが先天性心疾患・白内障・難聴
を特徴とする先天性風しん症候群をもって
生まれてくる可能性が高くなります。

